



CONSEILS CHATON

Vous venez d'adopter un chaton, voici quelques conseils afin que sa croissance se déroule dans de bonnes conditions :

➤ **VACCINATION** :

- Primo vaccination à partir de 8 semaines d'âge, Typhus et Coryza, associé à la leucose si mère vaccinée contre la leucose. Si la mère n'a pas été vaccinée, prévoir un test de dépistage avant toute vaccination contre la leucose, la maladie ayant pu être transmise par la mère.
- Rappels à 12 et 16 semaines d'âge.
- Vaccination rage + établissement d'un passeport européen à partir de l'âge de 3 mois (obligatoire si voyage à l'étranger, peut être nécessaire si séjour en camping ou en pension).

➤ **VERMIFUGATION** tous les mois jusqu'à 6 mois, puis minimum tous les 3 mois pour un chat allant à l'extérieur (même une fois par mois pour les chats chassant beaucoup). En cas de contact avec des jeunes enfants ou avec des personnes fragiles, une vermifugation toutes les 4 à 6 semaines est préférable car elle réduit totalement le risque de contamination de l'environnement par des œufs de parasites. Voir les sites www.bienvermifuger.com et www.esccap.fr

➤ **TRAITEMENT ANTIPARASITAIRE EXTERNE** si le chat sort ou est en contact avec un autre animal qui a accès à l'extérieur, nous vous conseillons de traiter durant toute l'année sauf en période hivernale à condition que l'hiver soit réel avec de vraies gelées.

- Par pipette spot-on : à renouveler tous les mois ou tous les 3 mois (selon la molécule administrée)
- Par comprimé : à renouveler tous les mois
- Par spray : à renouveler tous les mois
- Par collier Séresto pour les chats de plus de 4kg : à renouveler tous les 7 à 8 mois
- Par spray : à renouveler tous les mois

➤ **STERILISATION** à partir de 6 mois fortement recommandée :

- Pour les femelles :

Suppression des chaleurs, diminue les risques de développer des tumeurs mammaires, suppression du risque d'infection utérine et de contamination par le FIV (SIDA du chat) lors de rapports sexuels. La pilule contraceptive est fortement déconseillée du fait des effets secondaires fréquents observés : infection de l'utérus (nécessitant une chirurgie en urgence), cancer des ovaires et de l'utérus, tumeurs mammaires.

- Pour les mâles :

Diminue les risques de marquage urinaire, de bagarre avec les autres chats (diminution de l'instinct territorial), de fugue, et de contamination par le FIV (SIDA du chat) lors de rapports sexuels.

➤ **ALIMENTATION** : mixte recommandée (croquettes majoritairement et pâtée en complément)

- Pour chaton en croissance jusqu'à 6 mois
- Puis pour chat adulte stérilisé après la stérilisation pour limiter la prise de poids et réduire les risques de développer des cristaux urinaires
- De bonne qualité
- Ration à répartir en 3 à 4 repas quotidiens (gamelles distributrices, plateau de jeux, gamelles anti-glouton)

Nous vous conseillons notre site partenaire de commande en ligne (la qualité vétérinaire au prix du Net) : www.chronovet.fr

➤ **IDENTIFICATION** OBLIGATOIRE à partir de 7 mois (puce électronique posée le plus souvent lors de la stérilisation).

➤ Idéalement, ne pas laisser le chaton sortir avant l'âge de 6 mois (ou jusqu'à la stérilisation). Ainsi, il s'aventurera moins loin de la maison.

➤ Egalement à consulter le site www.tvm.fr rubrique les bons gestes au quotidien.